

เมื่อถูกสุนัข กัด ช่วน เลียบาดแผล ต้องรีบ



ล้างแผล ด้วยสบู่และ
น้ำสะอาดอย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง



ใส่ยา เมตาดีน



กักหมา ไว้ดูอาการ 10 วัน



หาหมอ เพื่อรับการป้องกัน
ที่ถูกต้อง และมาตามนัดทุกครั้ง

**ถูกสุนัขกัด
ต้องล้างแผล ใส่ยา
กักหมา หาหมอ
ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด**

คำแนะนำ

สำหรับคนเลี้ยงสุนัขและแมว



ฉีดวัคซีน ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ทำหมัน ไม่ให้
มีลูกมากเกินไป

เลี้ยงในบ้าน
ระวัง! อย่าให้
ไปกัดคนอื่น



คาถา 5 ข กั้นสุนัขกัด



**อย่า
แพย์** ให้สุนัขโมโห



**อย่า
เหยียบ** หาง หัว ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ



**อย่า
แยก** สุนัขที่กัดกัน
ด้วยมือเปล่า



**อย่า
หยิบ** อาหารที่สุนัข
กำลังกิน




**อย่า
ยุ่ง** กับสุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ



เทศบาลตำบลปากนคร

**โรคพิษสุนัขบ้า
อันตรายถึงตาย
หากไม่ได้ฉีดวัคซีน**



จัดทำโดย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
เกิดจากเชื้อเรบีส์ไวรัส เป็นได้
ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด



แต่ !!

สัตว์นำโรคที่สำคัญ คือ



สุนัข



แมว



กลุ่มเสี่ยง

คนที่ถูกหมากัด ข่วน
เลียบาดแผล แล้วไม่ไป
ฉีดวัคซีน



การติดต่อ

ถูกสัตว์ที่มีเชื้อ กัด ข่วน เลียบาดแผล



ดูอย่างไร

ว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะเริ่มแรก



นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง หงุดหงิด
เก็บตัว หวาดระแวง



ระยะต้นต้น



กระวนกระวาย กัดไม่เลือก
เห่าทอน



ระยะอัมพาต



น้ำลายไหล คางห้อยตก
ล้มลง ตาย



ความรู้ที่มักเข้าใจผิด



สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข มักไม่เป็น
โรคพิษสุนัขบ้า



สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข หากไม่ได้
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก็เป็นบ้าได้



โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น



โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้ทุกฤดู



โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว
รักษาให้หายได้



โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว
“รักษาไม่หาย ตายทุกราย”

